

酒精對人體的影響

酒精濃度	行為表現	肇事率
0.25mg/L	複雜動作有障礙，反應能力變差	2 倍
0.40mg/L	話多感覺能力有障礙	6 倍
0.50mg/L	說話含糊不清腳步不穩	7 倍
0.55mg/L	平衡感與判斷力障礙度升高	10 倍
0.75mg/L	明顯酒醉狀態、步履蹣跚	25 倍
0.85mg/L	噁心、嘔吐	50 倍
1.50mg/L	呆滯木僵、昏睡迷醉	迷醉
2.00mg/L	呼吸中樞麻痺、接近死亡	無法開車
2.50mg/L	死亡	

酒精濃度與肇事的關係

呼氣中酒精濃度 血液中酒精含量	啤酒 數量	行為表現 或狀態	肇事率
0.25mg/L 0.05%	2	複雜技巧障礙 駕駛能力變差	2 倍
0.40mg/L 0.08%	3	多話 感覺障礙	6 倍
0.55mg/L 0.11%	4	平衡感與判斷力 障礙度升高	10 倍
0.75mg/L 0.15%	5	明顯酒醉 步履蹣跚	25 倍
0.85mg/L 0.17%	6	噁心 步履蹣跚	50 倍
1.50mg/L 0.30%	7	呆滯木僵 可能昏迷	迷醉

註：啤酒酒精濃度為 5%時，體重 70 公斤的人喝 2 瓶啤酒就可能超過

0.25mg/L