



# 臺北市立聯合醫院藥品異動通知

## 異動說明：決標更替

	原採用藥品 (Old)	更換之藥品 (New)
處置代碼	OSPIR2	OSPIR3
英文商品名	Spironolactone	Spiron
中文商品名	蘇拉通錠 25 公絲	輸泌來錠
成份／含量	Spironolactone／25 mg	
劑型	tab.	tab.
廠牌	德周	居禮
許可證字號	衛署藥製字第 014015 號	衛署藥製字第 012081 號
健保代碼	A014015100	A0120811G0
用法用量	<p>一般成人劑量：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>利尿劑誘生之低血鉀症：每日 25-100mg，1 次或分成 2-4 次服用。</li><li>充血性心臟衰竭，肝硬化及腎病性徵候群導致的水腫：起始劑量，每日 25-200mg，分成 2-4 次服用，至少連續服用 5 日；維持劑量，每日 75-400mg，分成 2-4 次服用。</li><li>高血壓：起始劑量，每日 50-100mg，1 次或分成 2-4 次服用，至少連續服用 2 星期，視需要每 2 星期逐漸調節劑量至 1 日最高量 200mg；維持劑量，依病人所需而調節劑量。</li><li>原發性醛類脂醇過多症：維持劑量，手術前每日 100-400mg，分成 2-4 次服用。不適合手術的病患可以較小的劑量作為長期的維持劑量。</li></ol>	
適應症	利尿高血壓、原發性醛類脂醇過多症。	
副作用	可能有噁心、嘔吐、頭痛、嗜睡、毛髮增生、月經不規則、疲倦、皮膚發紅或發癢、易口乾等現象。	
警語及注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>治療期間請盡量避免飲酒。</li><li>服藥後請小心開車或操作危險機械。</li><li>每日服用 1 次者，最好在早晨服用，期將夜間睡眠時間的解尿次數減至最低。</li><li>避免食用過多的高鉀離子食物或鹽代用品或其他</li></ol>	

	<p>的鉀補充劑。</p> <p>5. 老年人對本藥之降血壓效應較為敏感，故須特別注意。</p>	
<p>藥品外觀</p>	 A photograph showing two small, round, yellow tablets placed on a wooden surface next to a ruler for scale. The ruler shows markings from 2 to 11 centimeters.	 A photograph of a single, round, orange tablet with embossed markings, set against a dark grey background.

藥劑部製 100.4