

臺北市立聯合醫院藥品異動通知

異動說明：決標新進品項

	新進藥品 (New)
處置代碼	IMIRC1
英文商品名	Mircera
中文商品名	美血樂針筒裝注射劑 100 微公克/0.3 毫升
成份	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta
含量/劑型	100 mcg/0.3 ml / pre-filled syringe
廠牌	羅氏大藥廠
許可證字號	衛署菌疫輸字第 000869 號
健保代碼	K000869255
用法用量	<p><u>目前未使用任何ESA治療的患者：</u></p> <p>用於治療目前未使用任何ESA之成人慢性腎衰竭患者的症狀性貧血時，Mircera的建議起始劑量為每兩週一次，以靜脈或皮下注射的方式投予單劑0.6微公克/公斤體重的劑量。</p> <p><u>目前正在使用ESA治療的患者：</u></p> <p>對目前正在使用 ESA 治療且血紅素值已維持穩定的患者，可改成每兩週或每月施打一劑 Mircera (詳仿單)。Mircera 的單劑靜脈或皮下注射劑量應視更換藥物時原先所使用之 ESA 的每週總劑量而定。</p>
適應症	治療慢性腎病所引起的症狀性貧血。Mircera 尚未核准於治療因癌症化學療法引起的貧血。
副作用	可能有血壓升高、頭痛、腹瀉、鼻咽炎等現象。
警語及注意事項	<ol style="list-style-type: none">請冷藏於 2-8°C 。請定期檢查血紅素值、監測血壓。當血紅素值趨近 12 g/dL 或在任 2 週期間內的上升程度超過 1 g/dL 時，應降低 Mircera 的劑量。應視個人狀況調整劑量，以使血紅素值達到並維持於

	10-12 g/dL 的範圍內。
藥品外觀	

藥劑部製 100.4