

臺北市立聯合醫院藥品異動通知

| | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 異動說明 | <input checked="" type="checkbox"/> 新進藥品(決標更替) <input type="checkbox"/> 外包裝變更 <input type="checkbox"/> 其它 | |
| 新舊藥品對照 | 舊藥品(Old) | 新藥品(New) |
| 處置代碼 | | IGEMM1 |
| 英文商品名稱 | | Gemmis Injection 38 mg/ml |
| 中文商品名稱 | | 健仕注射液 38 毫克/毫升 |
| 許可證字號 | | 衛署藥製字第 047872 號 |
| 健保代碼 | | AB47872243 |
| 廠牌名稱 | | 臺灣東洋藥品工業股份有限公司 |
| 主成分含量/劑型 | Gemcitabine 1000mg Inj. | |
| 適應症 | 1.非小細胞肺癌 2.胰臟癌 3.膀胱癌 4.Gemcitabine 與 paclitaxel 併用，可使用於曾經使用過 anthracycline 之局部復發且無法手術切除或轉移性之乳癌患者。5.用於曾經使用含鉑類藥物(PLATINUM-BASED)治療後復發且間隔至少 6 個月之卵巢癌，作為第二線治療。 | |
| 用法用量 | 依仿單指示說明。 | |
| 副作用 | 可能有血小板減少症、貧血及白血球減少、血尿及蛋白尿、呼吸困難及搔癢性的平疹與丘疹等現象。 | |
| 警語及注意事項 | 每次輸注時間需要超過一小時，每週不要超過一次。 1.接受化學治療之一般注意事項。治療期間不宜受孕或是哺乳 2.請病人告知醫師其正在使用的藥物；除非醫師同意，治療期間不宜施打任何疫苗。 3.如不慎皮膚接觸到藥物，需立刻用清水及肥皂洗淨，並通知醫護人員。 4.病患如同時併有腎臟或肝臟疾病，在治療前需先告知醫師。 5.需定期做血液方面的檢查。 6.高燒、喉嚨痛、皮膚紅疹或搔癢、靜脈注射部位紅腫熱痛、嚴重的嘔吐、呼吸困難，腳踝水腫、不正常出血等狀況發生時，需立即通知醫師。 | |
| 藥品外觀 |  | |