

# 臺北市立聯合醫院藥品異動通知

異動說明：決標更替

	原採用藥品 (Old)	更換之藥品 (New)
處置代碼	OWARF1	OMAF1
英文商品名	Lennon-Warfarin	Mafarin
中文商品名	瓦化寧錠 5 公絲	脈化寧錠 5 毫克
成份／含量	Warfarin sodium / 5mg	
劑型	Tab.	Tab.
廠牌	LENNON LIMITED	衛達
許可證字號	衛署藥輸字第 023426 號	衛署藥製字第 050095 號
健保代碼	B023426100	A050095100
用法用量	依個別病人的 PT/INR 值個別調整。(初劑量：2 ~ 5 mg/day，維持劑量：2 ~ 10 mg/day)。	
適應症	1.預防及/或治療靜脈栓塞症及其相關疾病，以及肺栓塞。 2.預防或治療因心房纖維顫動及/或更換心臟瓣膜引起之血栓性栓塞症。	
副作用	出血徵象、皮膚和其他組織壞死，出血的併發症有：麻痺、感覺異常、頭痛、胸痛、腹痛、關節痛、肌肉痛、眩暈、呼吸急促等。	
警語及注意事項	1. 定期測量 PT/INR 值或其他凝血試驗。(每個病人的 warfarin 治療是呈現高度個別化，warfarin 治療治療範圍很窄，會受其他藥物或維生素 K 的攝取所影響，維持穩定維生素 K 攝取量)。 2. 避免飲酒。 3. 懷孕期勿用，使用 warfarin 期間勿受孕。 4. 避免從事可能造成創傷的活動或運動。 5. 停止治療時，warfarin 的抗凝血效果可能延續 2 ~ 5 日。	
藥品外觀	 	