

臺北市立聯合醫院藥品異動通知

異動說明：決標新進品項

	新進藥品 (New)
處置代碼	OAVAN2
英文商品名	Avandamet Tablets 2mg/500mg "Spain"
中文商品名	"西班牙" 梵帝美膜衣錠 2 毫克/500 毫克
成份	Rosiglitazone maleate 2.65mg, Metformin hydrochloride 500mg
含量/劑型	2mg/500mg/膜衣錠
廠牌	GlaxoSmithKline
許可證字號	衛署藥輸字第 024459 號
健保代碼	B024459100
用法用量	本藥須由醫師處方使用 AVANDAMET™的治療應依照各個患者而定。應以空腹血糖 (FPG) 來評估 AVANDAMET™治療效果。 AVANDAMET™可以與食物併用或是空腹服用。與食物併用或是進食後服用可能會減少與 metformin 有關的腸胃道症狀
適應症	對於適合併用 rosiglitazone 及 metformin 治療的第二型糖尿病患者，Avandamet 可用於輔助飲食及運動以改善血糖控制
副作用	● Avandamet™ 的不良反應型態，與單獨使用 rosiglitazone maleate 及 metformin 相似 ✓ Rosiglitazone maleate 副作用：血紅素及血比容降低、水腫、體重增加、肝臟酵素升高等 ✓ Metformin hydrochloride：主要為腸胃道症狀如：噁心、嘔吐、腹瀉、下腹疼痛及喪失食慾
警語及注意事項	● 懷孕及授乳 懷孕分類為 C。不建議孕婦及授乳者

	<p>使用</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 兒童 不建議使用於兒童病患 ● 老年人 選擇劑量時應謹慎且定期監測腎功能為依據 ● 心衰竭者 不適用於心臟狀態為 NYHA 分類第 3 級、第 4 級及急性心衰竭的患者 ● 腎功能不良者 男性血清肌胺酸酐濃度 ≥ 1.5 mg/dL 或女性 ≥ 1.4 mg/dL 不建議使用 ● 肝功能不良者 ALT > 正常值之上限的 2.5 倍以上者，不應以 Avandamet™ 治療。建議前 12 個月應每 2 個月監測肝臟酵素，一年後應定期監測肝功能
<p>藥品外觀</p>	<p>正面</p>  <p>反面</p> 