

臺北市立聯合醫院藥品異動通知

異動說明：決標新進品項

	新進藥品 (New)
處置代碼	IMEDA1
英文商品名	Medason
中文商品名	命得生注射劑
成份	Methylprednisolone sodium succinate
含量／劑型	125mg／vial
廠牌	南光
許可證字號	衛署藥製字第 029085 號
健保代碼	A029085258
用法用量	<ol style="list-style-type: none">1. 當需要大劑量療法時，推薦劑量是 30mg/kg，靜脈注射以 10～20 分鐘施行，此劑量可於 48 小時內，每 4～6 小時重複 1 次。2. 其他適應症之第一次劑量可自 10mg 至 40mg，依據病情而決定之。
適應症	腎上腺機能不全、劇烈休克、支氣管性氣喘、膠原疾病、過敏反應、泛發性感染。
副作用	可能有體液貯留、肌肉無力、腹部脹氣、延遲傷口癒合、眩暈、頭疼等現象。
警語及注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 正在施行類固醇治療之病人遭受到不尋常的緊迫 (stress) 時，在緊迫情況呈現之前、期間及之後，需增加速效性類固醇之劑量。類固醇可能會掩蔽感染之若干病症，在使用期間新的感染亦可能會發生。2. 使用腎上腺類固醇時可能會減少抵抗力及使感染

	<p>無法限於局部。</p> <p>3. 病人正在使用腎上腺類固醇，特別是大量使用時宜避免各種免疫接種，因為可能會有神經系統之併發症之傷害及缺少抗體反應。</p> <p>4. 腎上腺皮質類固醇用於甲狀腺功能不足和肝硬化的病人，藥效會增強。</p>
藥品外觀	