

臺北市立聯合醫院藥品異動通知

異動說明：決標新進品項

| | 新進藥品 (New) |
|---------|--|
| 處置代碼 | ICLEX1 |
| 英文商品名 | Clexane |
| 中文商品名 | 克立生注射劑 |
| 成份 | Enoxaparin sodium |
| 含量／劑型 | 60mg /0.6ml／支(injection) |
| 廠牌 | Aventis |
| 許可證字號 | 衛署藥輸字第 022354 號 |
| 健保代碼 | B022354280 |
| 用法用量 | <p>預防手術後靜脈血栓症：</p> <p>中型手術(如一般外科)：手術前 2 小時，皮下注射 2000IU，一天一次。</p> <p>大型手術(如骨科手術)：手術前 12 小時，皮下注射 4000IU，一天一次。</p> <p>與 aspirin 併用以治療不穩定狹心症及非 Q-波之急性心肌梗塞：</p> <p>皮下注射 2 x 100IU/kg，每 12 小時一次，2~8 天。</p> <p>治療深部靜脈血栓症：</p> <p>皮下注射 100IU/kg，每 12 小時一次。</p> |
| 適應症 | 預防手術後靜脈血栓症；與 aspirin 併用以治療不穩定狹心症及非 Q-波之急性心肌梗塞；治療深部靜脈血栓症。 |
| 副作用 | 出血徵象、皮下注射之部位可能會發生小血腫。 |
| 警語及注意事項 | <p>A. 出血、由肝素引發血小板減少症(HIT)之危險性皆應做適當之評估與調整治療。</p> <p>B. 本品不建議使用於以下情況：</p> <p>1. 嚴重腎功能障礙。</p> |

2. 大腦內出血後 24 小時內。
3. 急性期之缺血性中風，具有或無意識失常。
4. 急性感染性心內膜炎。

藥品外觀



新包裝圖示

藥劑部製 98.5