

臺北市立聯合醫院藥品異動通知

異動說明：決標新進品項

	新進藥品 (New)
處置代碼	OTRIL3
英文商品名	Trileptal
中文商品名	除癲達口服懸浮液 6%
成份	Oxcarbazepine
含量／劑型	6% (60mg/ml) , 100ml / oral suspension
廠牌	Novartis
許可證字號	衛署藥輸字第 023538 號
健保代碼	B023538123
用法用量	成人及老年病患： <u>單獨治療、輔助治療：</u> Trileptal 開始用量須每天 600mg (8~10 mg/Kg/day) 分 2 次給藥，每天劑量 600mg 至 2400mg 間可提供理想的療效。若臨床上需要，劑量可以採每週最多比起始劑量增加 600 mg/day 的方式，以獲得較佳的臨床反應。 兒童： 兒童應以每日 8~10 mg/kg 體重的 Trileptal 開始治療，分 2 次投與。
適應症	成人局部癲癇發作之單一或輔助治療，大於一個月孩童癲癇局部發作之輔助治療。
副作用	可能有困倦想睡、頭疼、頭暈、複視、噁心、嘔吐和疲勞等現象。
警語及注意事項	1. 在使用本藥治療前應先檢驗其血清鈉含量。 2. 與酒精一起併用時應十分小心，因為可能引起加成的鎮靜作用。 3. 本藥含有 sorbitol，不應提供給患有果糖不耐症的罕見遺傳疾病患者。

4. 本藥已被證實會影響某一種口服避孕藥中的兩種成分：ethinylestradiol (EE)及 levonorgestrel (LNG)，因此當本藥併用荷爾蒙類避孕藥時，可能會使這些避孕藥失效。
5. 本藥會抑制 CYP2C19 的作用，當高劑量的 Trileptal 與經由 CYP2C19 代謝的藥品併用時可能會產生交互作用。

藥品外觀

