

臺北市立聯合醫院藥品異動通知

異動說明：決標更替

| | 原採用藥品 (Old) | 新進藥品 (New) |
|---------|---|--|
| 處置代碼 | ILIDO2 | ILIDO6 |
| 英文商品名 | Lidocaine HCl | Lidocaine HCl |
| 中文商品名 | 鹽酸利度卡因注射液 20 公絲/公撮 | 鹽酸利度卡因注射液 2 % |
| 成份 | Lidocaine HCl | |
| 含量/劑型 | 20mg/ml/amp. | 2 % 20ml/amp. |
| 廠牌 | 優良 | 濟生 |
| 許可證字號 | 衛署藥製字第 036886 號 | 衛署藥製字第 04864 號 |
| 健保代碼 | 自費 | 自費 |
| 用法用量 | 皮下或肌肉注射，1 次 10~300mg (相當於 0.5~15ml)。 | |
| 適應症 | 局部麻醉 | |
| 副作用 | 嗜睡、不安、興奮、眩暈、嘔吐、灼熱感、刺痛、壓痛、組織刺激等情形發生。 | |
| 警語及注意事項 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 嚴重休克及心臟傳導阻斷的病人應小心使用。 2. 在使用 Halothane 等含有 Halogen 吸入麻醉劑治療中或使用三環抗憂鬱劑之患者，當本藥與血管收縮劑併用，因可能增強心血管之作用，需慎重投與。 3. 注射時血管多的部位吸收較迅速，盡可能少量使用。 | |
| 藥品外觀 | |  |