

臺北市立聯合醫院藥品異動通知

異動說明：決標更替

	原採用藥品 (Old)	新進藥品 (New)
處置代碼	OUFOR1	OMETF2
英文商品名	Uformin	Metformin
中文商品名	克糖錠 500 公絲	新福胰持續性釋放錠 500 毫克
成份	Metformin HCl	
含量／劑型	500mg／tab.	500mg／E.R. tab.
廠牌	十全	Ivax
許可證字號	衛署藥製字第 036349 號	衛署藥製字第 048781 號
健保代碼	A0363491G0	A048781100
用法用量	開始劑量為 500 毫克每天 1 次隨晚餐服用。劑量增加應採每週增量 500 毫克，最大到每天 1 次 2000 毫克隨晚餐服用。	
適應症	第二型糖尿病。	
副作用	可能有低血糖、腹瀉、噁心、嘔吐、消化不良、頭痛、心悸等現象。	
警語及注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 服用 Metformin ER 時要定期監控腎功能。 2. 外科手術或注射顯影劑時應停用 Metformin ER。 3. 應避免過量服用酒精。 4. 肝功能低下時應避免使用。 5. Metformin ER 屬長效型製劑，使用時應整顆吞服，不可剝半或磨粉，否則即喪失長效性 	
藥品外觀		