

臺北市立聯合醫院藥品異動通知

異動說明：臨購藥品

	新進藥品 (New)
處置代碼	OITRA1
英文商品名	Itrazole Oral Solution
中文商品名	速克黴內服液劑
成份	Itraconazole
含量/劑型	10mg/ml ; 150ml/bot
廠牌	黃氏製藥股份有限公司
許可證字號	衛署藥製字第 047443 號
健保代碼	A047443161
用法用量	<ol style="list-style-type: none">1. 治療口腔和/或食道念珠菌感染：每日 200mg (2 個量杯的量)，分 1~2 次服用，持續一週。若一週後沒有反應，須再繼續治療一週。2. 治療對 Fluconazole 有抗藥性的口腔和/或食道念珠菌感染：每次使用 100~200mg，每日 1~2 次，持續二週。若二週後沒有反應，須再繼續治療二週。若未有好轉跡象時，每日使用劑量 400mg，不可超過 14 天。
適應症	治療 HIV 陽性反應及其他免疫功能不全病人的口腔念珠菌感染和/或食道念珠菌感染。
副作用	最常見之副作用為腸胃方面，如腹瀉、噁心、腹部疼痛及嘔吐。較少見之副作用包括頭痛、肝臟酵素之可逆性增加、經期不規則、眩暈及過敏反應（如搔癢、皮疹、蕁麻疹及血管性水腫）。
警語及注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 持續治療超過一個月的病人，及一旦出現肝炎症

狀，如厭食、噁心、嘔吐、疲倦、腹部疼痛、或尿液顏色變深的病人，建議要監測其肝功能。假如有異常現象，應終止治療。

2. 若因速克黴內服液劑之投與而出現神經病變時，應停止治療。

藥品外觀



藥劑部製 98.3.27