

臺北市立聯合醫院藥品異動通知

異動說明：專案採購

	新進藥品 (New)
處置代碼	IOXOC1
英文商品名	Oxocin injection
中文商品名	謳速生注射液 10 國際單位/公撮 (催產素)
成份	Oxytocin
含量/劑型	10 I.U./ml / amp.
廠牌	大豐
許可證字號	衛署藥製字第 033873 號
健保代碼	A033873229
用法用量	<ol style="list-style-type: none">1. 通常一次 1~5 單位(I.U)注射於皮下或肌肉內。(如行靜脈注射應使用點滴法或以一個單位為限徐徐注入之)。2. 對於應用本劑最多之分娩第二期之微弱陣痛，應先注射 1~5 單位於皮下筋內後，監視子宮收縮狀態及兒心音約 3~10，如用量不足則再注射 1~3 單位。胎兒娩出後則不妨一次注射 10~20 單位於皮下或肌肉內。
適應症	分娩誘導、陣痛微弱、子宮內容除去術時之應用 (胞狀奇胎搔爬)、弛緩性子宮出血、分娩後或手術後之子宮出血、子宮收縮不全。
副作用	<ol style="list-style-type: none">1. 母親：過敏性反應、分娩後出血、心律不整、噁心、嘔吐。2. 胎兒：心跳徐緩、新生兒黃疸。
警語及注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 本劑請冷藏於 2 ~ 8°C。2. 對於分娩初期子宮頸管之擴張不完全時或骨盤狹窄者切勿使用本劑。3. 正確投與本劑時，會刺激子宮產生與正常分娩相似

的收縮；不正確授與本劑使子宮過度收縮時，對母親及胎兒都造成危險。即使正確投與，患者之子宮對本劑過敏者也會發生高張收縮。

藥品外觀



藥劑部製 98.9