

市政統計週報

(第 525 號)


發稿單位：臺北市政府主計處
發稿日期：98 年 8 月 5 日
聯絡人：黃珣雲 1999(外縣市 02-27208889)轉 7624

【提要】97年臺北市男性標準化死亡率為每十萬人449.24人，女性為291.00人，男性約為女性的1.5倍，兩性十大主要死因之首均為惡性腫瘤。

依臺北市政府衛生局統計，97年臺北市男性死亡人數為8,992人，死亡率為每十萬人705.67人，標準化死亡率為每十萬人449.24人，女性則分別為6,127人、每十萬人453.23人及每十萬人291.00人，男性標準化死亡率約為女性的1.5倍，十大主要死因死亡人數及標準化死亡率皆呈現男高於女的現象，而兩性標準化死亡率差距最大的為惡性腫瘤，差距最小的為肺炎。

與96年比較，男性十大主要死因新增慢性下呼吸道疾病(ICD-10新增分類項目)，而慢性肝病及肝硬化則退居第12名，其餘順位上升者為肺炎及敗血症，下降者為糖尿病、蓄意自我傷害及腎炎、腎病症候群及腎病變；女性十大主要死因新增骨骼肌肉系統及結締組織之疾病(ICD-10新增分類項目)及高血壓性疾病，而意外事故、慢性肝病及肝硬化則分別退居第11、13名，其餘順位上升者為肺炎及敗血症，下降者為腎炎、腎病症候群及腎病變與蓄意自我傷害。

97 年臺北市兩性十大主要死因死亡率情形



97 年臺北市兩性十大主要死亡原因概況

		單位：人/十萬人										
項目別	總計	惡性 腫瘤	心臟疾病 (高血壓性 疾病除外)	腦血管 疾病	肺炎	糖尿病	慢性下 呼吸道 疾病	意外 事故	敗血症	腎炎、腎病 症候群及 腎病變	蓄意自我 傷害 (自殺)	其他
男 性	順位	--	1(1)	2(2)	3(3)	4(5)	5(4)	6(...)	7(7)	8(10)	9(6)	10(8)
	死亡率	705.67	211.73	100.29	53.13	48.58	27.62	26.45	21.11	20.64	18.83	18.13
	標準化 死亡率	449.24	140.18	60.74	32.56	26.32	17.36	13.76	17.19	11.78	11.24	15.00
女 性	順位	--	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(6)	6(5)	7(10)	8(11)	9(...)	10(7)
	死亡率	453.23	130.86	54.44	38.61	26.93	24.49	18.57	18.49	12.58	11.02	10.28
	標準化 死亡率	291.00	87.54	32.75	22.90	16.79	14.14	11.35	10.99	7.27	6.25	8.19

資料來源：臺北市政府衛生局。

附註：(1)表中括弧內為96年順位。(2)96年係以國際疾病傷害及死因分類標準第9版(ICD-9)進行統計，97年則改以第10版(ICD-10)進行死因統計，因標準不同，僅就年總資料及順位比較，至各死因分類部分則不予比較。(3)標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

* 本週報自88.5.11起透過下列網際網路發行，自第122號起於本處網站發行電子報，並自第496號起改版；另本處自98年起新增不定期發布之「臺北市統計專題分析報告」。

* 本處網址www.dbas.taipei.gov.tw。

* 市府網址www.taipei.gov.tw市政資訊項下市政統計區。