

市政統計週報

(第 530 號)


發稿單位：臺北市政府主計處
發稿日期：98 年 9 月 9 日
聯絡人：黃珣雲 1999(外縣市 02-27208889)轉 7624

【提要】97年臺北市男性癌症（即惡性腫瘤）標準化死亡率為每十萬人140.18人，女性為87.54人，男性約為女性的1.6倍，兩性十大主要癌症死因之首均為氣管、支氣管和肺癌。

依臺北市政府衛生局統計，97年臺北市男性癌症（即惡性腫瘤）死亡人數為2,698人，粗死亡率為每十萬人211.73人，標準化死亡率為每十萬人140.18人，女性則分別為1,769人、每十萬人130.86人及每十萬人87.54人，男性標準化死亡率約為女性的1.6倍；十大主要癌症死因標準化死亡率呈現男高於女的現象，其中差距最大的為食道癌，差距最小的為非何杰金氏淋巴瘤。

與96年比較，男、女性十大主要癌症死因均新增白血病，至膽囊和其他膽道癌則分別退居第13、11名，其餘順位男性上升者為口腔癌及胰臟癌，下降者為非何杰金氏淋巴瘤；女性上升者為胰臟癌及卵巢癌，下降者為子宮頸及部位未明示子宮癌與非何杰金氏淋巴瘤。

97年臺北市兩性十大主要癌症死因粗死亡率情形



97年臺北市兩性十大主要癌症死亡原因概況

單位：人/十萬人

項目別	總計	氣管、支氣管和肺癌	肝和肝內膽管癌	結腸、直腸和肛門癌	胃癌	前列腺(攝護腺)癌	口腔癌	胰臟癌	食道癌	非何杰金氏淋巴瘤	白血病	其他
男性	粗死亡率 211.73	46.54	38.30	26.13	17.11	9.73	9.02	8.95	8.40	5.96	5.96	35.63
男性	標準化死亡率 140.18	29.96	27.11	16.86	10.69	5.35	6.44	6.11	5.90	3.65	4.28	23.84
女性	粗死亡率 130.86	24.78	17.31	16.87	15.76	6.95	5.77	5.55	4.29	4.07	3.33	26.19
女性	標準化死亡率 87.54	16.27	11.20	11.66	10.79	4.47	3.76	3.62	2.96	2.73	2.61	17.46

資料來源：臺北市政府衛生局。

附註：(1)表中括弧內為96年順位。(2)96年係以國際疾病傷害及死因分類標準第9版(ICD-9)進行統計，97年則改以第10版(ICD-10)進行死因統計，因標準不同，僅就年總資料及順位比較，至各死因分類部分則不予比較。(3)標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

* 本週報自88.5.11起透過下列網際網路發行，自第122號起於本處網站發行電子報，並自第496號起改版；另本處自98年起新增不定期發布之「臺北市統計專題分析報告」。

* 本處網址www.dbas.taipei.gov.tw。

* 市府網址www.taipei.gov.tw市政資訊項下市政統計區。