

市政統計週報

(第 626 號)


發稿單位：臺北市政府主計處
發稿日期：100 年 7 月 27 日
聯絡人：黃珣雲 27287624

【提要】99年臺北市男性標準化死亡率為每十萬人421.30人，女性為265.58人，男性約為女性的1.6倍，兩性十大主要死因之首均為惡性腫瘤。

依臺北市政府衛生局統計，99年臺北市死亡人數男性為8,882人、女性為6,165人，死亡率男性為每十萬人704.08人、女性為每十萬人456.13人，以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準所計算之標準化死亡率男性為每十萬人421.30人、女性為每十萬人265.58人，男性約為女性的1.6倍；十大主要死因之標準化死亡率均呈現男性高於女性的現象，而兩性標準化死亡率均以惡性腫瘤為首，且其差距為最大，敗血症則差距最小。

與98年比較，男性十大主要死因新增高血壓性疾病，從第12名上升至第9名，而原為第9名之蓄意自我傷害則退居第11名；女性十大主要死因中，順位上升者為腎炎、腎病症候群及腎病變，下降者為敗血症。

99 年臺北市兩性十大主要死因標準化死亡率



99 年臺北市兩性十大主要原因概況

單位：人/十萬人

項目別		總計	惡性腫瘤	心臟疾病 (高血壓性 疾病除外)	腦血管 疾病	肺炎	糖尿病	慢性下 呼吸道 疾病	事故 傷害	腎炎、腎病 徵候群及 腎病變	高血壓性 疾病	敗血症	其他
男 性	順位	--	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)	6(6)	7(7)	8(8)	9(12)	10(10)	--
	死亡率	704.08	219.66	82.36	47.72	43.44	30.44	26.56	20.45	18.55	18.31	18.23	178.36
	標準化 死亡率	421.30	137.29	47.58	26.99	21.00	17.70	12.91	16.18	10.57	9.74	9.72	111.62
項目別		總計	惡性腫瘤	心臟疾病 (高血壓性 疾病除外)	腦血管 疾病	肺炎	糖尿病	慢性下 呼吸道 疾病	敗血症	骨骼肌肉系統 及結締組織之 疾病	高血壓性 疾病	慢性下 呼吸道 疾病	其他
女 性	順位	--	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)	6(7)	7(6)	8(8)	9(9)	10(10)	--
	死亡率	456.13	137.69	50.61	32.92	28.48	25.97	17.76	16.20	15.54	14.13	9.62	107.21
	標準化 死亡率	265.58	85.62	27.23	17.61	16.12	12.95	9.80	8.98	7.61	7.43	4.94	67.28

資料來源：臺北市政府衛生局。

附註：表中括弧內為 98 年順位；標準化死亡率係以 2000 年 W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

* 本週報自 88.5.11 起透過下列網際網路發行，自第 122 號起於本處網站發行電子報，並自第 496 號起改版；另本處自 98 年起新增不定期發布之「臺北市統計專題分析報告」。

* 本處網址 www.dbas.taipei.gov.tw。

* 市府網址 www.taipei.gov.tw 市政資訊項下統計資料區。