



翡翠水庫
mammal profile
生態簡介

哺乳類



以一句話形容哺乳類動物的特徵，就是「吃媽媽的奶長大，身上有毛」。其實當然不只這樣，而且總是會有例外。生物的分類依序為界、門、綱、目、科、屬、種，哺乳類在動物分類中屬於脊索動物門、脊椎動物亞門、哺乳綱。目前全世界的哺乳類動物已經有 29 目 153 科 1,229 屬 5,600 多種，包含陸地跟水中，幾乎地球上的所有環境中都有哺乳類棲息著。人類與被視為「毛小孩」的貓狗寵物，只是這些哺乳動物中的 3 種而已。

「哺乳類」這個字源自德文中的 *Säugetiere*，由 *saugen*（喝母乳）及 *tier*（動物）所組成。而在中文造字裡，「哺」是用「口」、「捕捉」或是以「口」、「輔助」，表示放入嘴裡吃，或是給予食物，因此「哺乳」就是餵奶養育的意思。其他主要的特徵還有內溫性（從前說的恆溫、溫血動物）、具有胎盤（胎生）、有外耳殼、心臟分為兩心房兩心室等。但也有像鴨嘴獸那種例外，雖然是用乳汁餵養小孩的哺乳類，卻是生蛋的。

臺北市府 臺北翡翠水庫管理局

地址 / 23160 新北市新店區新烏路三段 43 號
電話 / (02)2666-7811 ~ 3
傳真 / (02)2666-4349
政風檢舉專線 / (02)2666-4960
http://www.feitsui.gov.taipei
臺北市民當家熱線 1999

廣告

協辦單位 / 財團法人臺北動物保育教育基金會
地址 / 臺北市文山區萬安街 44 巷 8-2 號 1 樓
電話 / (02)2239-2587
攝影 / 鄭錫奇、詹德川
撰文 / 張東君
設計、繪圖 / 黃麗珍、黃子辰

臺灣彩蝠

Kerivoula taiwana

分類：翼手目蝙蝠科

特徵：頭體長 3.8~5 公分，是小型食蟲性蝙蝠，毛色從灰褐色到褐色，耳殼顏色半透明，形狀像海芋。
習性：夜行性，除了蜚蠊目（蟑螂）、鞘翅目（甲蟲）、革翅目等小型昆蟲以外，也會捕食蜘蛛及盲蛛等，獵物多半為不會飛或不太飛的節肢動物。每年 5~7 月為繁殖育幼期，每年僅生一胎，產一仔蝠。

分布：廣泛分佈於臺灣中低海拔的竹林、森林、農墾區。是翡翠水庫 15 種蝙蝠中個體數最多的。



臺灣山羌

(臺灣特有亞種)

Muntiacus reevesi micurus

分類：偶蹄目鹿科

特徵：頭體長 40~70 公分，是臺灣體型最小的鹿科動物。雄性頭上有每年會脫落重長的短角。由於叫聲聽起來有點像狗叫，又被稱為「吠鹿」。
習性：獨居，全日都會活動，以晨昏時最為旺盛。草食性，食物以植物的嫩葉、幼芽、嫩草為主。由於體型小跑得快，雖然遇到危險時會先躲藏，在天敵接近時再迅速逃竄，但仍常成為野狗的犧牲品。

分布：從低海拔到 3,000 公尺的山區森林都有，在天然闊葉林或混生林、雜木林較常見。



赤腹松鼠

Callosciurus erythraeus

分類：啮齒目松鼠科

特徵：有大而圓的眼睛、膨大明顯的尾巴、灰褐色的背部、紅棕色的腹部。體長 18~24 公分，體重 500 公克以下。

習性：臺灣最常見的日行性野生動物之一，不只在森林，即使是校園、公園、動物園中也很常見，也因此會被不當餵食。植食性，主要吃植物的果實與種子。

分布：廣泛分佈於臺灣各地的闊葉林、針葉林、次生林、墾植地等，但在中低海拔較常見。



臺灣獼猴

(臺灣特有種)

Macaca cyclops

分類：靈長目猴科

特徵：頭體長 36~45 公分，粗又長的尾巴有 26~46 公分。頭圓，具有可以暫存食物的頰囊。

習性：群居，以 10~30 隻左右最為常見。通常在白天活動，活動範圍以樹上為主。雜食性，找到什麼吃什麼，以植物的嫩莖葉及果實為主，但也會吃昆蟲。

分布：廣泛分佈於臺灣各地海拔 100~3,600 公尺的山區森林。近年來由於侵入農墾區或人類食域，經常發生人猴衝突事件。



食蟹獾

(臺灣特有亞種、珍貴稀有保育類)

Hepstes ura formosanus

分類：食肉目獾科

特徵：粉紅色或紅色的鼻子很醒目。全身呈灰褐色到褐色，頭體長 36~46 公分，體毛尾毛膨鬆。又名棕獾貓。

習性：日行性動物，但較常在晨昏活動。擅長游泳，棲息在溪流附近森林的岩洞或自己挖的土洞中。真的會抓螃蟹吃，也吃魚蝦、青蛙、蜥蜴、蛇類、鼠類、蝸牛、大型昆蟲等。

分布：低海拔山區森林及溪流附近。



麝香貓

(臺灣特有亞種、珍貴稀有保育類)

Viverricula indica taiwana

分類：食肉目靈貓科

特徵：頭體長 52~55 公分、尾長 30~31 公分。身體為密布黑褐色斑點的黃褐色。細長的尾巴上有 8~9 個黑白相間的環紋。

習性：夜行性動物，通常單獨活動，遇到危險時會躲到草叢中。肉食性，主要吃鼠類、爬蟲類、昆蟲等。

分布：低海拔山麓至海拔 1,000 公尺左右的山區闊葉林。



臺灣野山羊

(臺灣特有種、珍貴稀有保育類)

Capricornis swinhoei

分類：偶蹄目牛科

特徵：雌雄皆有角，全身為深褐色，腮、喉部和上頸為淺黃褐色。頭體長 80~114 公分。

習性：舊名臺灣長鬃山羊。通常單獨活動，晨昏為活動高峰。有強烈的領域性，會以位於眼睛下方的腺體在樹枝或突起物體上塗抹，標示領域。草食性，以植物的幼芽及嫩葉為主食。擅長在陡峭岩石及山區跳躍行走。

分布：從低海拔山麓到海拔 3,500 公尺的山區均有分布，但以中高海拔針闊葉混生林及原始針葉林區較常見。



臺灣野兔

(臺灣特有亞種)

Lepus sinensis formosus

分類：兔形目兔科

特徵：身體背部黃褐色，頭體長 30~40 公分，耳朵大而突出，長 8~10 公分。尾巴很短，通常不到 6 公分。

習性：夜行性，白天在草叢或灌木林中棲息，傍晚至清晨出外活動覓食。草食性，以嫩草及植物的嫩芽幼葉為食。通常不築巢不挖洞，在遇到危險時會瞬間奔跳脫逃。

分布：廣泛分佈於臺灣近海平面的草地到海拔 2,600 公尺的高山地區，但主要分佈於海拔 500 公尺以下。



穿山甲

(臺灣特有亞種、珍貴稀有保育類)

Manis pentadactyla pentadactyla

分類：鱗甲目穿山甲科

特徵：有大大外耳殼和眼睛，頭上及身體背面側面均被灰褐色鱗片覆蓋，鱗片間、腹部、四肢內側有毛。舌頭很長，沒有牙齒。

習性：前腳的爪子很長，用來挖掘洞穴棲身或是尋找蟻窩、白蟻。夜行性，會爬樹也會游泳。遇到危險時會以頭部為中心捲成球狀，以背部的鱗片朝外（但仍不敵成群的流浪狗攻擊）。由於中國人的藥補食補，已讓牠們急速瀕臨絕種。

分布：主要分佈於山麓到海拔 1,000 公尺的山區，但以 300~500 公尺的闊葉林或次生林較常見。



臺灣野豬

(臺灣特有亞種)

Sus scrofa taiwanus

分類：偶蹄目豬科

特徵：身體為灰褐色、毛既粗又硬。頭體長 90~180 公分，尾巴很短。小時候身上有黃褐色條紋，在三個月大以後會逐漸消失。

習性：日夜都會活動的群居性動物，但以日行性為主。視力不佳但嗅覺靈敏，常以嗅覺找尋食物，再拱地翻掘取食。雜食性，以植物根莖果實為主，也會吃從土中翻出來的土壤動物，如蚯蚓、昆蟲幼蟲、軟體動物等。

分布：普遍分佈於臺灣低海拔到 3,000 公尺的山區及丘陵，在山谷、河邊、淺山、人類耕作種植地區都可看見。

