

包裝異動公告-GI Klean Powder (PEG3350) 腸見淨粉劑

舊包裝圖示

腸見淨® 粉劑
GI Klean® Powder

水果口味

成分與含量：	
Polyethylene Glycol 3350	59g
Sodium Sulfate Anhydrous	5.685g
Sodium Bicarbonate	1.685g
Sodium Chloride	1.465g
Potassium Chloride	0.7425g

用法及用量：
每包須以1000ml冷開水泡製成溶液，攪拌至粉末完全溶解，每10-15分鐘喝250ml，重複服用2-4包或至排出液澄清為止，但需在4-6小時內服用完畢。

適應症：
腸道檢查、手術前淨腸

衛署藥製字第 057180 號

腸見淨® 粉劑
GI Klean® Powder

使用方法：

- 檢查前一天開始限制進食，以低脂低渣食品或代餐包取代一般飲食。
- 每包須以1000ml冷開水泡製成溶液，攪拌至粉末完全溶解。
- 每10-15分鐘喝250ml，重複服用2-4包或至排出液澄清為止，但需在4-6小時內服用完畢。
- 清腸時間約3~4小時。

衛署藥製字第057180號

委託商：虹鈺生技有限公司
製造廠：衛達化學製藥股份有限公司

委託商：虹鈺生技有限公司
製造廠：衛達化學製藥股份有限公司

腸見淨® 粉劑
GI Klean® Powder

水果口味

適應症	
腸道檢查、手術前淨腸。	
成分與含量	
Polyethylene Glycol 3350	59g
Sodium Sulfate Anhydrous	5.685g
Sodium Bicarbonate	1.685g
Sodium Chloride	1.465g
Potassium Chloride	0.7425g

用法及用量
每包須以1000ml冷開水泡製成溶液，攪拌至粉末完全溶解。每10~15分鐘喝250ml，重複服用2~4包或至排出液澄清為止，但需在4~6小時內服用完畢。

衛署藥製字第 057180 號
包裝規格：10包/盒

委託商：虹鈺生技有限公司
製造廠：衛達化學製藥股份有限公司

LOT NO. :
EXP. DATE :

委託商：虹鈺生技有限公司
地址：臺中市北區北興街296巷5號3樓之3
製造廠：衛達化學製藥股份有限公司
地址：台中市工業區23路21號

新包裝圖示

腸見淨® 粉劑
GI Klean® Powder

水果口味

適應症：腸道檢查、手術前淨腸
口味：水果口味

成分與含量：	
Polyethylene Glycol 3350	59.0000 g
Sodium Sulfate Anhydrous	5.6850 g
Sodium Bicarbonate	1.6850 g
Sodium Chloride	1.4650 g
Potassium Chloride	0.7425 g

用法用量：
每包須以一公升水配製成溶液，口服給予。
服用前2小時不要進食，直到得腸檢查或手術結束。
成人(包括老人)應遵照圖示指示，選擇以下任一方式服用：
檢查或手術前一天傍晚一次服用：
每包須以一公升水配製成溶液，每10至15分鐘喝250毫升，至排出液澄清或服4包量為止，但需在4至6小時內服用完畢。
分為兩次服用：
每包須以一公升水配製成溶液，2包(配製的溶液2公升)於檢查或手術前一天傍晚服用；剩餘2包(配製的溶液2公升)於檢查或手術當天早晨服用。
建議第一杯溶液至少在半小時前一小時喝完，以確保完全排淨。
若以鼻胃管給予者，其速率為每分鐘20至30毫升。
腎功能不全之病人應更改劑量。
兒童：不建議使用。

衛署藥製字第057180號

腸見淨® 粉劑
GI Klean® Powder

檢查或手術前一天傍晚一次服用：

- 檢查前，請遵照圖示進食，以低脂低渣食品或代餐包取代一般飲食。
- 每包須以一公升冷開水泡製成溶液，攪拌至粉末完全溶解。
- 每10-15分鐘喝250ml，重複服用2-4包或至排出液澄清為止，但需在4-6小時內服用完畢。
- 清腸時間約3~4小時。

衛署藥製字第057180號

委託商：虹鈺生技有限公司
製造商：衛達化學製藥股份有限公司

委託商：虹鈺生技有限公司
製造商：衛達化學製藥股份有限公司

腸見淨® 粉劑
GI Klean® Powder

水果口味

適應症：腸道檢查、手術前淨腸

成分與含量：	
Polyethylene Glycol 3350	59.0000 g
Sodium Sulfate Anhydrous	5.6850 g
Sodium Bicarbonate	1.6850 g
Sodium Chloride	1.4650 g
Potassium Chloride	0.7425 g

用法用量：
每包須以一公升水配製成溶液，口服給予。
服用前2小時不要進食，直到得腸檢查或手術結束。
成人(包括老人)應遵照圖示指示，選擇以下任一方式服用：
檢查或手術前一天傍晚一次服用：
每包須以一公升水配製成溶液，每10至15分鐘喝250毫升，至排出液澄清或服用4包量為止，但需在4至6小時內服用完畢。
分為兩次服用：
每包須以一公升水配製成溶液，2包(配製的溶液2公升)於檢查或手術前一天傍晚服用；剩餘2包(配製的溶液2公升)於檢查或手術當天早晨服用，建議最後一杯溶液至少在半小時前一小時喝完，以確保完全排淨。
若以鼻胃管給予者，其速率為每分鐘20至30毫升。
腎功能不全之病人應更改劑量。
兒童：不建議使用。

衛署藥製字第057180號

LOT NO. :
EXP. DATE :

包裝規格：10包/盒
衛署藥製字第 057180 號

委託商：虹鈺生技有限公司
地址：臺中市北區北興街296巷5號3樓之3
製造廠：衛達化學製藥股份有限公司
地址：臺中市工業區23路21號

委託商：虹鈺生技有限公司
製造廠：衛達化學製藥股份有限公司

委託商：虹鈺生技有限公司
製造廠：衛達化學製藥股份有限公司

新舊包裝異動描述

1. 藥品鋁箔、外盒包裝變更，自批號 115304 起。

臺北市立聯合醫院藥劑部 依據民國 110 年 12 月 09 日廠商來函公告，包裝更新時間點依廠商配貨及各院使用情形而異。