

藥物成分

劑型

編號

Flutamide

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

護腺寧錠 250 公絲/錠 (Fuprostate)

☞ 藥品作用

Flutamide可抑制雄性激素吸收、抑制雄性激素的作用，用於前列腺癌的輔助治療。

☞ 服用方式

1. 通常每日 3 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對 flutamide 錠劑中任何成分過敏、肝功能疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血藥 warfarin。
3. 常見副作用為性慾降低、熱潮紅、腹瀉、噁心嘔吐，男性女乳症及乳部觸痛、偶有乳漏現象，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 任何時候，只要出現黃疸或肝生化檢查高於正常值上限 2-3 倍，應立即停止治療。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：極度疲倦/不適、厭食且上腹痛疼痛、茶褐色尿、黃疸、頭暈耳鳴臉色蒼白。
6. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，若使用在於男性也須避免使伴侶懷孕，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。