



藥物成分

劑型

編號

Raloxifene

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

鈣穩膜衣錠 60 毫克/錠 (Evista F.C.)

希鈣膜衣錠 60 毫克/錠 (Pharoxifene F.C.)

## ☞ 藥品作用

本藥為選擇性雌激素接受體調節劑(SERM)，可減緩停經後骨質流失的速度，用以預防或治療停經後婦女之骨質疏鬆症。

## ☞ 服用方式

1. 通常為每日 1 次，每次 1 粒，請固定時間，飯前飯後皆可。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是乳房腫塊或乳癌、癌症或腫瘤、鬱血性心衰竭、靜脈血栓疾病(包括深部靜脈血栓、肺栓塞及眼部血栓)、高血脂、肝臟等疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是全身性雌激素、cholestyramine 或是其他陰離子交換樹脂、抗凝血劑 warfarin、抗生素 ampicillin。
3. 服用本藥時**為避免發生靜脈血栓的副作用，應避免長時間臥床或久坐不動(例如在長程飛行上應起身活動)**，若需進行任何手術前請先告知醫師正在服用本藥，並詢問是否需停藥。
4. 常見副作用為**熱潮紅和腿抽筋**，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**視覺/說話/活動協調異常、陰道出血、乳房腫痛、呼吸困難、咳血、胸口/四肢疼痛或麻木、腿部腫脹痙攣。**
6. 懷孕等級 X，有可能懷孕的婦女應採取有效的避孕措施或避免使用本藥，若疑有懷孕應立即與醫師聯絡；此外服用本藥時也不建議哺餵母乳，必要時請與醫師/藥師討論。