

藥物成分

劑型

編號

Carteolol

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

美特朗錠 5 毫克/錠 (Mikelan)

☞ 藥品作用

高血壓、狹心症。

☞ 服用方式

1. 通常每日 2~3 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是支氣管氣喘、支氣管痙攣、顯著心搏過慢、心原性休克、充血性心衰竭、低血壓、肝、腎機能障礙、甲狀腺中毒症的患者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 verapamil、diltiazem、clonidine 等。
3. 可能會遮蔽低血糖發作時的情形，使其症狀不易察覺，糖尿病患者必須注意血糖值。
4. **本藥用來保護心臟時需長期定時服用**，若已長期服用未經醫師許可請勿任意突然停藥，可能會導致病情惡化。
5. 常見副作用為四肢冰冷、疲倦無力、頭暈，偶爾可能會引起皮膚紅疹、腸胃不適，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：疑似氣喘症狀(咳嗽、呼吸困難)、嚴重徐脈、暈厥。
7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。