



藥物成分

劑型

編號

Sunitinib

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

紓癌特膠囊 12.5 毫克/膠囊 (Sutent)

☞ 藥品作用

是一種抗腫瘤標靶藥，可減緩或停止體內癌細胞生長。治療腸胃道間質腫瘤、晚期腎細胞癌、胰臟神經內分泌腫瘤。

☞ 服用方式

1. 通常於腸胃道間質腫瘤及晚期腎細胞癌：每日1次，每次4粒。治療四週接著停藥休息兩週的方式給藥。
2. 通常於胰臟神經內分泌腫瘤：每日1次，每次3粒，無停藥期。
3. 可隨餐服用亦可空腹使用。
4. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是有肝功能不全、左心室功能障礙及高血壓患者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是CYP3A4 強抑制劑、CYP3A4 誘發劑，或活性疫苗。
3. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁及飲酒。
4. 常見副作用為腹瀉、噁心、疲勞、口腔黏膜破損、肌肉關節疼痛、抑鬱失眠、皮膚變黃、手足症(手腳出現紅腫、刺麻腫痛感、脫屑、水泡)，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：血壓飆高、不明出血、血便/黑便/血尿、上腹疼痛/嚴重虛弱、皮膚眼睛變黃、腎病變、大片紅斑紅疹且合併類流感症狀、胸痛/呼吸困難。
6. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。