



藥物成分

劑型

編號

Olmesartan

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

雅脈膜衣錠 40 毫克/錠 (Olmotec F.C.)

## ☞ 藥品作用

血管收縮素 II 受體拮抗劑(ARBs)，用來治療高血壓。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。空腹或與食物併服皆可。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是：腎功能不良、離子不平衡（低血鈉或高血鉀）或充血性心衰竭疾病、曾對本藥主成份 olmesartan 或其他成份過敏。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是含 **aliskiren** 成份之藥物。
3. 請避免使用過量高鉀的食品或是低鈉鹽。
4. 如有需全身麻醉手術，請事先告訴醫師正在服用此藥。
5. 常見副作用為頭暈、頭痛，一般都不嚴重且不一定會發生，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：意識混亂，心跳不規律，呼吸急促(以上可能是血鉀過高造成)、過敏反應(皮膚疹、搔癢或蕁麻疹)、水腫、排尿量改變、發燒。
7. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥分泌到母乳的量不明，需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。