



藥物成分

劑型

編號

Telmisartan

口服藥

∞ 藥品商品名及含量

必康平錠 80 毫克/錠 (Micardis)

∞ 藥品作用

本藥為血管收縮素 II 受體拮抗劑，用來治療原發性高血壓。

∞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 本藥易受潮，藥品請保存於鋁箔包裝內，用前才由包裝內剝出，有需要分裝也請連同鋁箔包剪好。
3. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

∞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是懷孕或哺乳；膽道阻塞性疾病；嚴重肝、腎功能損傷。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他降血壓劑、aliskiren、保鉀利尿劑、鉀離子補充劑、麻黃、非類固醇抗發炎止痛藥。
3. 本藥含有山梨醇 (sorbitol)，患有遺傳性果糖不耐症者請先詢問過醫師/藥師。
4. 請避免吃過量高鉀食品，若要使用低鈉鹽請事先諮詢醫師。
5. 如有需全身麻醉手術，請事先告訴醫師正在服用此藥。
6. 常見副作用為類感冒症狀、疲倦，少見發生姿勢性低血壓 (坐臥姿變換站姿時易頭暈)，一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：意識混亂，心跳不規律，呼吸急促 (以上可能是血鉀過高造成)、過敏反應 (皮膚疹、舌頭喉嚨腫起來、搔癢或蕁麻疹)、水腫、排尿量改變。
8. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，由於尚未建立授乳期間使用資料，不建議用於授乳期間。