



藥物成分	劑型	編號
Hyoscyamine	口服藥	

## ☞ 藥品商品名及含量

薪保賜康錠 0.125 mg/錠 (Buwecon)

## ☞ 藥品作用

緩解平滑肌痙攣，可治療多種疾病，如胃潰瘍、胃酸分泌過多、腸胃道痙攣、痙攣性結腸炎、膀胱炎、妊娠嘔吐、痛經。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1~4 次，每次 1 粒；12 歲以下兒童請按醫師醫囑。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。  
若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

本藥鋁箔膜是厚的，無法直接壓出藥錠。

需沿著藥片黑色指示掀開一角再將鋁箔膜拉開，才能將藥粒取出。



## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是青光眼、阻塞性尿路症狀(如前列腺肥大)、任何胃腸道阻塞或功能疾病、急性出血之不穩定性心血管狀態、潰瘍性結腸炎及重症肌無力之患者。
2. 常見副作用為口乾、排尿困難、心跳加快、頭痛、嗜睡、眩暈、失眠、噁心、便秘、脹氣、減少排汗，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請盡速回診。
3. 如果有下列症狀，請立刻就醫：蕁麻疹、運動失調、睡眠困難、混亂或興奮、視覺模糊/複視、心悸、吞嚥困難。
4. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。