



# 藥物成分

# 劑型

# 編號

## Buformin

## 口服藥

### 药品商品名及含量

必庫那錠 50 毫克/錠 (Bigunal)

### 药品作用

本藥可減少葡萄糖的吸收及降低肝臟製造葡萄糖，並增加胰島素的敏感性，達到控制血糖的效果，主要用來治療第二型(非胰島素依賴型)糖尿病。

### 服用方式

- 通常每日 1~3 次，飯後服用，須整粒吞服不得磨碎。
- 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

### 注意事項

- 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是酮酸中毒病史、高血糖高滲透壓非酮性昏迷、嚴重感染、腎臟或肝臟功能異常或要進行外科手術。
- 請告訴醫師/藥師您是否有在服用其他藥物(包含保健食品)。
- 服用本藥不得飲酒，酒精會加重副作用產生。
- 如要接受含碘化物顯影劑的放射性診斷檢查(常見有尿道攝影、肝膽道攝影、血管攝影、斷層掃描等)，本藥須在檢查前後 48 小時停止使用。**
- 常見副作用為腹瀉、噁心或嘔吐等腸胃道不適，但一般都不嚴重，可回診時告知醫師。
- 可能會出現極罕見的乳酸中毒副作用，若有呼吸急促、昏睡、酸痛、全身不適、畏寒、眩暈等症狀請立刻就醫。**
- 單獨使用本藥極少出現低血糖，但若與其他有低血糖副作用的降血糖藥物併用時，須特別留意低血糖及監測血糖。
- 無懷孕期間相關研究，若女性計畫懷孕請告知醫師/藥師；本藥哺乳期間亦無相關研究，若有哺乳需求也請事先諮詢。