



藥物成分	劑型	編號
Ezetimibe	口服藥	107

☞ 藥品商品名及含量

怡妥錠 10 公絲/錠 (Ezetrol)

脂易穩錠 10 毫克/錠 (Ezetimibe Sandoz)

☞ 藥品作用

原發性高膽固醇血症、同型接合子家族性高膽固醇血症、植物脂醇血症。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 可以在一天中的任何時候服用，隨餐或空腹均可。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是中、重度肝功能異常者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血藥物 warfarin 及降膽酸藥物及其他降血脂藥物。
3. 需與膽酸結合樹脂(cholestyramine，一種降膽酸藥)隔開服用，先吃 ezetimibe 需隔兩小時後才能服用另一種；先吃 cholestyramine 必須間隔四小時以上才能服用另一種。
4. 常見副作用為腸胃道不適(腹痛、腹瀉、脹氣)、肌肉痠痛、疲勞，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：
 - A. 不明的肌肉疼痛、觸痛、虛弱無力或發燒。
 - B. 如果出現肌肉疼痛合併尿液變深或糞便顏色變白。
 - C. 關節疼痛和極度疲倦等現象。
 - D. 過敏反應(皮疹、蕁麻疹、喉部水腫或口腔破皮脹痛)。
6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請務必告知醫師，本藥可能會分泌到母乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。