



藥物成分

劑型

編號

Gemfibrozil

口服藥

藥品商品名及含量

脂福膜衣錠 600 毫克/錠 (Gemd F.C.)

藥品作用

治療高脂血症，可以降低血中三酸甘油酯及極低密度脂蛋白膽固醇，提升高密度脂蛋白膽固醇。

服用方式

1. 通常每日 2 次，每次 1 粒，**早餐及晚餐前 30 分鐘服用。**
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝、膽、腎臟方面疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血藥 warfarin 或其他降血脂或降膽固醇藥品。
3. 常見副作用為消化不良、腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、皮疹等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
- 4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：不明肌肉疼痛、虛弱無力。**
5. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。