



藥物成分	劑型	編號
Voriconazole	口服藥	

☞ 藥品商品名及含量

歐癩平膜衣錠 200 毫克/錠 (Voriconazole Sandoz F.C.)

☞ 藥品作用

治療嚴重的黴菌感染(侵入性麴菌症、侵犯性念珠菌感染、鐮刀菌之嚴重黴菌感染或預防免疫力不全患者之黴菌感染。

☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，每次 1~2 粒，建議空腹使用，於飯前一小時或飯後二小時後服用。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。
即使症狀改善也請確實完成療程，避免產生抗藥性。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**肝功能不良**、對 azole 類抗黴菌藥/本藥賦形劑過敏之患者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是：terfenadine、astemizole、cisapride、pimozide、quinidine、sirolimus、rifabutin、rifampicin、carbamazepine 及長效型巴比妥類藥物 (例如 phenobarbital)。
3. 本藥可能對於視覺造成暫時且可逆的影響，包括**視覺模糊、視覺感知的改變/加強和/或畏光**，在沒確定此類藥物對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 常見副作用有**視覺障礙、出疹、嘔吐/噁心、腹瀉、頭痛、周邊水腫、發燒**，一般都不嚴重，若症狀惡化請回診。
5. 曾有肝臟相關之不良反應報導，服藥期間建議監測肝功能。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**視覺障礙、皮膚紅疹或嘴破(合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐)、腹瀉、嚴重頭痛、虛弱、嚴重腹痛、眼睛/皮膚變黃、周邊水腫。**
7. 不能排除胎兒/嬰兒風險，且無足夠的安全性資料，不建議孕期或哺乳期使用，除非醫師評估利益大於風險。