藥物成分	劑型	編號
Metformin/Pioglitazone	口服藥	

ꕥ 藥品商品名及含量

愛妥蜜膜衣錠 850 毫克/15 毫克/錠 (Actosmet)

ꕥ 藥品作用

本藥會降低血糖，適用於配合飲食和運動，以改善第二型糖尿病患者的血糖控制。

ꕥ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

ꕥ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心臟病、腎臟病變、腎臟功能不全、肝臟病變、急慢性代謝性酸中毒。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 rifampicin、isoniazid、glyburide、furosemide、phenytoin、digoxin、quinidine、vancomycin、利尿劑、甲狀腺藥物等。
3. **如要接受含碘化物顯影劑的放射性診斷檢查(常見有尿道攝影、肝膽道攝影、血管攝影、斷層掃描等)，本藥須在檢查前後 48 小時停止使用**。
4. 常見副作用為腸胃道不適、腹瀉、**頭痛、水腫**、體重增加，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. **如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(皮疹、搔癢、起泡或剝脫皮膚、呼吸困難)、骨痛、視力改變、排尿困難等**。
6. 本藥可能會出現低血糖症狀，請至糖尿病衛教室索取低血糖衛教單張。
7. 無法排除對胎兒是否有傷害，女性計畫懷孕或已懷孕就診時請務必告知醫師，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。