



藥物成分	劑型	編號
Glimepiride/ Metformin	口服藥	

☞ 藥品商品名及含量

美爾胰膜衣錠 2 毫克+500 毫克/錠 (Amaryl M F.C.)

利控糖膜衣錠 2 毫克+500 毫克/錠 (Glimet F.C.)

☞ 藥品作用

本藥為複方，可促使胰臟釋出胰島素，也可增加胰島素的敏感性，進而降低血糖。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1-2 次，每次 1 粒，於用餐前或隨餐服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是酮酸中毒病史、腎臟或肝臟功能異常、乳糖吸收不良。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是類固醇、抗凝血藥 warfarin、降血壓藥或其他降血糖藥。
3. 服用本藥不得飲酒，酒精會加重副作用產生。
4. 如要接受含碘化物顯影劑的放射性診斷檢查(常見有尿道攝影、肝膽道攝影、血管攝影、斷層掃描等)，本藥須在檢查前後 48 小時停止使用。
5. 服藥初期因血糖濃度改變，可能產生短暫性視力障礙，也可能有噁心嘔吐、腹瀉或腹痛等腸胃道不適，一般都不嚴重且會逐漸改善。
6. 若症服用本藥可能發生低血糖，請索取低血糖衛教單張號。
7. 本藥懷孕及哺乳期間都不建議使用，女性計畫懷孕或已懷孕或有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。