



藥物成分

Ivabradine

劑型

口服藥

編號

☞ 藥品商品名及含量

康立來膜衣錠 5 毫克/錠 (Coralan F.C.)

☞ 藥品作用

穩定的慢性心衰竭。

☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，每次 1 粒，隨餐服用(跟食物一起吃)。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是、嚴重低血壓(血壓<90/50mmHg)、先天性乳糖吸收/代謝疾病，不適合服用此藥；並慎用於 QT 波延長或肝腎功能不全患者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗黴菌劑(ketoconazole、itraconazole)、macrolide 抗生素 (clarithromycin、erythromycin)、抗病毒藥 (nelfinavir、ritonavir)、diltiazem、verapamil 及其他影響心律的藥物。
3. 服藥期間請避免飲用葡萄柚汁或食用大量葡萄柚。
4. 本藥可能會讓人對光源變化敏感，在強光變化環境可能產生罕見的光幻視(在不會發光的物體上看到亮光/幻覺)，在還沒確定此類藥物對您有何影響前，請小心開車或操作危險機械，若有出現光幻視也應馬上回診告訴醫師/藥師。
5. 常見副作用為頭痛、頭暈、發光現象(光幻覺)、視力模糊與心跳緩慢，但一般不嚴重，若症狀惡化無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心律不整、血壓異常過低(相較於平時血壓)、心跳過慢(<50 下/分鐘)。
7. 懷孕等級 X，懷孕期間不建議使用，女性計畫懷孕或已懷孕請務必告知醫師；動物研究指出本藥會分泌到乳汁中，且可能有嬰兒風險，請避免哺餵母乳。