



藥物成分

劑型

編號

Ticlopidine

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

利血達膜衣錠 100 毫克/錠 (Licodin F.C.)

☞ 藥品作用

可用於防止血液的過度凝集，可用來降低中風的危險性。

☞ 服用方式

1. 通常每日 2~3 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是消化道潰瘍、有出血症狀、血友病或肝腎方面病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他抗凝血藥物、theophylline 或 phenytoin。
3. 如果有要開刀或拔牙，請事先告訴其他科別的醫師或牙醫師或藥師您正在服用此藥。
4. 請避免/小心容易出現割傷或瘀傷之危險性活動。
5. 常見副作用為**輕微皮疹、食慾降低、腸胃不適或易有小瘀青**，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. **如果有下列症狀，請立刻就醫：白血球減少症或感染症狀(如：不明的發燒、畏寒/虛弱、喉嚨痛等)、皮膚/眼睛變黃、嘔吐、食慾不振、倦怠、搔癢、皮膚有針狀出血或瘀青、血尿、說話困難、抽搐，身體單側虛弱，尿液顏色變深。**
7. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師；本藥目前哺乳安全性未建立，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。