

藥物成分

劑型

編號

Miglitol

口服藥

131

☞ 藥品商品名及含量

麥若醣膜衣錠 50 毫克/錠 (Migbose®)

☞ 藥品作用

第二型糖尿病。

☞ 服用方式

1. 通常每日 3 次，每次 1~2 粒。
2. **建議在每餐時與第一口食物一起咬碎吞下。**
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是明顯消化吸收障礙、大腸激躁症或肝腎功能不全。
2. 除非醫師有特別指示，本藥禁用於糖尿病酮酸血症、發炎性小腸疾病、結腸潰瘍或部分腸道阻塞、及對 Miglitol 或本藥賦形劑會過敏之病人。
3. 請告訴醫師您是否有在服用其他藥物，特別是毛地黃 digoxin、心血管用藥 propranolol、腸道吸附劑 charcoal。
4. 常見副作用為腸胃道症狀(例如:脹氣、腹瀉、腹痛)，但通常不嚴重，可藉由減少食用碳水化合物改善，且一般過幾周症狀會慢慢消失，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 單獨使用本藥極少出現低血糖，但若與其他有低血糖副作用的降血糖藥物併用時，須特別留意低血糖及監測血糖。
6. **使用本藥若發生低血糖時，不可服用非單醣類糖分作補充(例如蔗糖、糖果或家用糖)，須使用果糖或葡萄糖作補充。**
7. 懷孕等級 B，若女性計畫懷孕請告知醫師/藥師；本藥資料不足無法排除嬰兒風險，不建議於哺乳期間使用。