



藥物成分	劑型	編號
<b>Sitagliptin</b>	口服藥	

## ◎ 藥品商品名及含量

佳糖維膜衣錠 100 毫克/錠 (Januvia F.C.)

## ◎ 藥品作用

本藥主要作用刺激胰島素的生物合成作用與釋出作用，進而達到治療第二型糖尿病的效果。

## ◎ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ◎ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是胰臟炎、肝腎功能不全方面病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 fluoroquinolones。
3. 常見副作用為低血糖症狀(視力模糊、冒冷汗、膚色蒼白、嗜睡)、腹部疼痛、噁心嘔吐、腹瀉、上呼吸道感染，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：全身性過敏、血管水腫、蕁麻疹等。
5. 本藥懷孕資料尚不明確，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥會分泌到大鼠乳汁中，對於人類乳汁分泌的量不明，不建議授乳婦女使用。