



藥物成分	劑型	編號
Hydroxyurea	口服藥	

☞ 藥品商品名及含量

愛治膠囊 500 公絲/膠囊 (Hydrea)

☞ 藥品作用

本藥為抗腫瘤藥，可減緩或停止體內癌細胞的生長，可用來治療黑色素瘤、慢性髓性白血病、卵巢癌、頭/頸鱗狀細胞癌。

☞ 服用方式

1. 間歇療法採 3 天服用 1 次的方式使用，持續療法則每天 1 次使用，劑量依照病人體重和腎功能調整。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腎功能不良。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他骨髓抑制劑或接受放射線治療、降尿酸用藥、warfarin。
3. 如欲接種活性疫苗，請先詢問醫師或藥師。
4. 在接觸瓶子或膠囊前後，均應清洗雙手。
5. 本藥有骨髓抑制之副作用，可能會使白血球較低，請出入公共場合時戴口罩、勿生食(水果去皮)、不要接觸感冒的人/土壤/汙物/排泄物、小心避免自己受傷，並隨時注意自己有沒有感冒/喉痛、虛弱/發燒或小便灼熱疼痛等症狀。
6. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、食慾不振、骨髓抑制等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：紅疹/皮疹/搔癢、呼吸或吞嚥困難、嚴重腹瀉、視覺遲鈍。
8. 服用此藥物之婦女應有避孕措施，本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。