

藥物成分

劑型

編號

Sofosbuvir

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

索華迪膜衣錠 400 毫克/錠 (Sovaldi F.C.)

☞ 藥品作用

與其他抗病毒藥物併用可以治療成人慢性C型肝炎。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。此藥昂貴且療程重要，請務必按照療程指示服藥，盡可能不要發生漏服藥品的狀況。
2. 若不慎忘記服藥，當天發現，請立即補服，但若發現時已是隔天在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是 **B 型肝炎**、**心律不整**，或其他心臟 / 肝臟 / 腎臟等疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是制酸劑 (胃藥)、降血脂藥、amiodarone、carbamazepine、phenytoin、rifampin、聖約翰草、tipranavir、其他 HIV 抗病毒藥等。
3. 在服藥期間內請盡量不要飲酒，會給肝臟帶來負擔。
4. 常見副作用為腹瀉、貧血、失眠、頭痛、疲憊、瘀青等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**皮膚/眼白變黃(黃疸)**、**不明原因的發燒/虛弱發冷**、**口腔喉嚨腫大/潰爛破皮**、**嚴重腹瀉**；此藥與心律不整藥 amiodarone 併用可能發生嚴重的心搏變慢(<50 下/分)。
6. 懷孕等級 B，但因與其他抗病毒藥的複合治療是絕對禁止於懷孕期使用(也不能使伴侶懷孕)，故有計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。