



藥物成分

劑型

編號

Terazosin

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

抗樂素錠 2 毫克/錠 (Kinzosin)

暢流錠 2 毫克/錠 (Teradrin)

## ☞ 藥品作用

高血壓、良性攝護腺肥大症。

## ☞ 服用方式

1. 用於高血壓時，通常每日 1 次，每次 0.5~2.5 粒。
2. 良性攝護腺肥大症，通常睡前 1 次，每次半~5 粒。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，如肝功能不良。
2. 第一次服用本品可能會感到暈眩，建議變換姿勢須小心，可於睡前服用。
3. 常見副作用為低血壓、水腫、噁心、頭痛、頭暈、疲倦，一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心跳過速、癲癇、黃疸、陰莖異常勃起、極低低血壓。
5. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。