



藥物成分

劑型

編號

Bromhexine

口服粉劑

药品商品名及含量

捨咳顆粒 8 毫克/克 1 克/包 (Sheco Granules)

药品作用

祛痰及減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性。

服用方式

1. 一天 3 次，成人每次 1 包，12 歲以上適用成人劑量；6 歲以上未滿 12 歲，每次 1/2 包；3 歲以上未滿 6 歲，每次 1/4 包；3 歲以下之嬰幼兒，請依醫師指示，不宜自行使用。
2. 曾經因本藥引起過敏症狀者不得使用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾患（包括如慢性支氣管炎、肺氣腫）所引起之咳嗽，及伴有濃痰之咳嗽病人請勿自行使用。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 副作用非常少見，可能有噁心、上腹部疼痛、嘔吐、頭痛、頭暈、皮膚紅疹等現象，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：如有過敏反應（如皮膚或黏膜潰爛）、紅疹、搔癢、喉頭臉部腫脹。
5. 懷孕等級 A，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。目前沒有哺乳相關的資料，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。