



藥物成分

劑型

編號

Sulfasalazine

口服藥

药品商品名及含量

撒樂腸溶錠 500 毫克/錠 (Salazine E.C.T.)

药品作用

具有抗發炎、免疫抑制及抗菌的作用，可用治療發炎性腸道疾病及類風濕性關節炎。

服用方式

- 劑量依病人情形而變化很大，通常每日 2~4 次，每次 2~4 粒，隨餐服用，第一次使用本藥須先從低劑量開始，再慢慢增加劑量。請整粒配一大杯水吞服，不可咬碎或磨粉。
- 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

注意事項

- 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**磺胺類/乙醯水楊酸類藥物過敏**、**蠶豆症(G6PD 缺乏症)**、**血液性疾病(如白血病或貧血)**、**急性間歇性紫質症**或**肝腎功能不良**。
- 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 digoxin、葉酸或其他免疫抑制劑。
- 服用期間可能會使尿液/皮膚呈黃橙色，是正常無害的。
- 因疾病的某些症狀與藥物之副作用相同，因此有時比較難分辨是否為副作用，但常見的副作用有腹瀉、頭痛、喪失食慾、胃不舒服、嘔吐、胃痛，一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
- 如果有下列症狀，請立刻就醫：**皮膚紅疹/發癢、蕁麻疹、水腫、喉嚨痛、吞嚥困難、不明發燒/疲倦衰弱、皮膚蒼白或發黃、不尋常出血或瘀血，請立刻就醫或回診。
- 懷孕等級 B，若女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師/藥師；哺乳可能會對嬰兒有風險，有需要哺乳請事先諮詢。