

藥物成分

劑型

編號

Atenolol

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

愛平諾膜衣錠 50 毫克/錠 (Atinol F.C.)

壓平樂膜衣錠 100 毫克/錠 (Ateol F.C.)

☞ 藥品作用

乙型交感神經阻斷劑，適用於治療高血壓、狹心症以及急性心肌梗塞。本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師/藥師。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1~2 次，每次 1 粒。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是氣喘、慢性阻塞性肺病、2 度或 3 度心臟傳導阻礙、心博遲緩、心臟休克或有明顯症狀的心臟衰竭。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是鈣離子通道阻斷劑 verapamil 或 diltiazem。
3. 因為這個藥會讓心跳變慢，糖尿病病友服用後可能使低血糖副作用發生時的心跳過速不明顯，請病友注意。
4. **本藥用來保護心臟時需長期定時服用**，若已長期服用未經醫師許可請勿任意突然停藥，可能會導致病情惡化。欲停藥前先請教醫師，需在醫師監督下以 1~2 個禮拜期間逐漸降低。
5. 常見副作用為四肢冰冷、疲倦無力、頭暈，偶爾可能會引起皮膚紅疹、腸胃不適，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. **如果有下列症狀，請立刻就醫：呼吸短促或哮喘、胸痛、體重忽然增加、足踝下肢水腫。**
7. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有哺乳需求請事先諮詢醫師/藥師。