



藥物成分

劑型

編號

Gestrinone

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

佑汝膠囊 2.5 毫克/膠囊 (Gestrin)

## ☞ 藥品作用

本藥主要用抑制下視丘釋放促性腺激素。也可抑制卵巢合成雌激素及黃體激素，可做為子宮內膜異位症治療劑。

## ☞ 服用方式

1. 一般用量為每週 2 次，每次服用 1 粒。通常於月經週期第一天(或醫師指定的日期)服用第 1 粒，三天後服用第 2 粒，此後，固定於每週的相同二天且最好於相同時間服用。
2. 如果忘記服藥 1 次，則於發覺時立即服用 1 粒，並持續每週 2 次服藥。忘記 2 次或更多次，請回診或連繫醫療人員。

## ☞ 注意事項

1. 若有下列情形則勿服用，應與醫師諮商：懷孕或打算懷孕、哺乳嬰兒期間、患有心臟、腎臟或肝臟疾病。曾接受荷爾蒙類藥物治療(包括避孕藥)曾有不適症狀者。
2. 請告知醫生或藥師您是否在使用包括避孕藥、治療癲癇及結核病的藥品，它們可能會干擾本品的作用。
3. 常見副作用可能包括皮膚產生斑點、粉刺及油膩、體重增加、食慾改變、熱潮紅、頭痛、痙攣、抑鬱及腸胃不適；有些患者可能有性慾、乳房大小、聲音等改變，這些一般都不嚴重，若症狀惡化無法忍受請回診。
4. 治療後約 2-4 個月，8 成以上的婦女會有停經的現象，但這是暫時的，若停藥後約 1-2 個月便可恢復月經週期。
5. 本藥非避孕藥，不可做為避孕用途，於治療期間應避孕(但不可使用口服避孕藥，請使用保險套)。
6. 懷孕等級 X，女性計畫懷孕或已懷孕就診時請務必告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。