



藥物成分	劑型	編號
Quinapril	口服藥	

☞ 藥品商品名及含量

恩久平膜衣錠 10 毫克/錠 (Accupril F.C.)

☞ 藥品作用

高血壓及充血性心衰竭

☞ 服用方式

1. 通常成人一天服用 1~2 次，每次 1~4 粒。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥就可以，不要為了補吃錯過的劑量而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是有腎臟、頭頸部血管性水腫、肝衰竭、嗜中性白血球過低症、顆粒性白血球缺乏症。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾因接受 ACE 抑制劑治療而發生血管性水腫。
3. 如有需全身麻醉手術，請事先告訴醫師正在服用此藥。
4. 常見輕微副作用有低血壓、噁心、嘔吐、**頭暈**、頭痛、乾咳和疲倦，請於下次回診時向醫師告知，若症狀嚴重難以忍受，請儘速回診向醫師反應。
5. **如果有下列症狀，請立刻就醫：血管水腫(常見於眼唇腫起來)，臉部、舌頭、聲門及喉頭腫脹，導致嚴重性呼吸短促的現象。**
6. 懷孕等級 D，女性有懷孕的可能或已懷孕請主動告知醫師，本藥可能會分泌至乳汁，若需要哺乳事先諮詢醫師/藥師。