



藥物成分

劑型

編號

Propranolol

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

恩特來錠 10 毫克/錠 (Inderal)

心康樂錠 40 毫克/錠 (Cardolol)

☞ 藥品作用

降血壓、狹心症、心律不整、偏頭痛、控制焦慮性心搏過速、甲狀腺毒症的輔助劑、親鉻細胞瘤。

☞ 服用方式

1. 依適應症不同一天可服用 2~4 次，飯後服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數，即使您已感覺好轉，仍應繼續服用此藥。未經醫師同意前不可自行停用本藥。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥就可以了，不要為了補吃錯過的劑量而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 clonidine、毛地黃、epinephrine、phenylephrine、insulin、xanthine、MAOI、phenothiazines、amiodarone。
3. 因為這個藥會讓心跳變慢，糖尿病病友服用後可能使低血糖副作用發生時的心跳過速不明顯，請病友注意。
4. **本藥用來保護心臟時需長期定時服用**，若已長期服用未經醫師許可**請勿任意突然停藥**，可能會導致病情惡化。
5. 常見副作用為嗜睡、疲勞、頭暈、手腳冰冷、心跳變慢，偶爾可能會引起皮膚紅疹、腸胃不適，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列罕見症狀，請立刻就醫：呼吸困難、喉嚨痛、胸痛、心跳不規則、四肢水腫情形。
7. 懷孕分級：C。女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師