



藥物成分	劑型	編號
Sildenafil-2	口服藥	

☞ 藥品商品名及含量

瑞肺得膜衣錠 20 毫克/錠劑 (Revatio F.C.)

☞ 藥品作用

肺動脈高血壓之治療以改善運動能力。

☞ 服用方式

1. 每次 1 粒，間隔 4-6 小時，每日 3 次。
2. 本藥在醫師指示下可作為小兒先天性心臟病造成的肺動脈高壓，此時服用方法請務必遵照醫師指示。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**高血壓及心臟疾病**。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是甲型阻斷劑(alpha blockers)、**硝酸鹽類(nitrates)藥**、**威爾鋼或其他治療勃起障礙的藥**不可與本藥併用，以免發生致命低血壓。
3. **禁止與含硝酸鹽藥物及葡萄柚(汁)併服。**
4. 本藥可能會讓人暈眩/視力模糊，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
5. 常見副作用為**頭痛、面潮紅、消化不良、腹瀉、頭暈、皮膚疹**等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
1. **如果有下列症狀請立刻就醫：勃起持續超過4小時、聽力喪失/耳鳴、視覺異常/模糊、視覺顏色異常、嘔吐、嚴重暈眩/虛弱、心悸或其他嚴重不適。**
2. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。本藥尚未知是否會分泌到母乳裡，哺乳婦女要使用必須非常謹慎小心，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。