



藥物成分

劑型

編號

Phenytoin/
Phenobarbital

口服藥

◎ 藥品商品名及含量

樂安錠 50 毫克+20 毫克/錠 (L.A.)

◎ 藥品作用

Phenytoin作用於腦部/神經系統可用來治療各種類型的癲癇。Phenobarbital(俗名:巴比妥)，可用來控制癲癇或作為鎮靜劑來緩解焦慮、短期用來治療失眠。此藥也可能用於治療其他病症，請詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

◎ 服用方式

1. 通常每日 3 次，每次 1 粒。
2. 即使您已感覺好轉，仍應繼續服用此藥；**未經醫師同意前，不可自行停用此藥**，尤其是已經服用大劑量一段時間後；突然停藥可能導致抽搐，醫師可能會逐漸降低劑量。
3. **請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數**。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

◎ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是酒精、安眠劑(zolpidem)、鎮靜解焦慮劑(lorazepam、clonazepam、diazepam、brotizolam、estazolam)、抗凝血劑(warfarin)、口服避孕藥、類固醇、三環抗憂鬱劑(imipramine)。
3. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的作用。
4. **本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性/協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。**
5. 常見副作用為頭昏、頭痛、噁心、嘔吐、便祕、緊張，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. **如果有下列症狀，請立刻就醫：昏迷、喘不過氣、異常出血、呼吸及吞嚥困難、皮膚過敏現象。**
7. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。