



藥物成分

劑型

編號

Chlorambucil

口服藥

药品商品名及含量

瘤克寧錠 2 公絲/錠 (Leukeran)

药品作用

是一種抗腫瘤藥物，用來治療惡性淋巴瘤、濾泡性淋巴瘤。

服用方式

- 通常 0.2 毫克/公斤/天，劑量依體重病況而有所不同，並持續服用 4~8 週。
- 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。
若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

注意事項

- 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是先前已對本藥有抗藥性的患者、癲癇、肝腎功能不良。
- 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 phenylbutazone、需接種活性疫苗時。
- 使用本藥物建議密切監測血球數，且不可用於剛經過放射線治療或接受其他毒性藥物治療的病人。
- 本藥有骨髓抑制之副作用，可能會使白血球較低，請出入公共場合時戴口罩、勿生食(水果去皮)、不要接觸感冒的人/土壤/汙物/排泄物、小心避免自己受傷，並隨時注意自己有沒有感冒/喉痛、虛弱/發燒或小便灼熱疼痛等症狀。
- 常見副作用為骨髓抑制、噁心、嘔吐、腹瀉及口腔潰瘍等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
- 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重過敏(毒性表皮壞死溶解)、癲癇發作、全部血球減少。
- 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，盡量避免哺乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。
- 本藥品應置於攝氏 2~8 度冰箱內(勿冷凍)。**