



藥物成分	劑型	編號
Mefenamic acid	口服藥	

### ☞ 藥品商品名及含量

保痛樂膠囊 250 毫克/膠囊 (Potarlon)

痛疏達膠囊 250 毫克/膠囊 (Ponstal)

### ☞ 藥品作用

發燒、頭痛、肌肉痠痛、經痛等症狀治療，主要功能為消炎及解熱鎮痛。

### ☞ 服用方式

1. 通常每日 3~4 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

### ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否曾對阿斯匹靈(aspirin)或非類固醇類抗發炎藥過敏，或是有其他疾病，特別是胃腸道潰瘍或慢性發炎、肝腎疾病或嚴重心衰竭。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血藥 warfarin、利尿劑、血管張力素轉換酶抑制劑(ACEI)、血管張力素受體阻斷劑(ARB)、皮質類固醇、cyclospoine、methotrexate。
3. 常見副作用為皮膚搔癢、皮疹、腸胃道不適、噁心、嘔吐、頭痛、頭暈，但一般不嚴重，若症狀惡化無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：血壓突然飆高、史蒂文生強生症候群(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)、多型性紅斑、毒性表皮壞死溶解、腸胃道出血、潰瘍、肝病變、腎病症候群或氣喘急性發作。
5. 此藥物能否通過胎盤仍未知，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會微量分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。