



藥物成分	劑型	編號
Mesalazine	口服藥	

## ☞ 藥品商品名及含量

頗得斯安持續性藥效顆粒劑 2 克/包 (Pentasa PR granules)  
阿腸克錠 800 毫克/錠 (Asacol Gastro-resistant Tablets)

## ☞ 藥品作用

Mesalazine 是抑制發炎的藥物，主要用來治療潰瘍性結腸炎。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 2~2.4 克，可分數次服用。
2. 頗得斯安持續性藥效顆粒不能咀嚼，應先將小包顆粒倒在舌頭上，用水或果汁吞服。
3. 阿腸克錠建議飯前服用，不可以咀嚼或剝半。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病正在服用其他治療藥物，特別是對本藥物或水楊酸藥(阿斯匹靈)過敏者、現在有服用抗凝血劑(warfarin)、消炎止痛藥、azathioprine、methotrexate。
2. 2 歲以下兒童及嚴重肝腎功能不良者不可使用本品。
3. 常見副作用為關節痛、腹痛、脹氣、輕微絞痛、打嗝、嘔吐、鼻炎、消化不良，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請盡速回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：不明的出血、血腫、紫斑症、貧血、持續性發燒、喉嚨痛、呼吸困難、吞嚥困難。
5. 女性如有計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳者請事先諮詢醫師/藥師。