

藥物成分

劑型

編號

Repaglinide

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

柔糖錠 1 毫克/錠 (Repaglinide)

☞ 藥品作用

本藥能增加胰島素分泌，也能讓人體能更有效的利用胰島素來降血糖，主要用來治療第二型(非胰島素依賴型)糖尿病。

☞ 服用方式

1. 通常每日 2~3 次，須隨餐使用，建議**飯前 15 分鐘內到用餐前服用**。若突然少吃一餐，則少服用一次(沒進食則不要吃藥)；反之若多吃一餐則要多服用一次。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是酮酸中毒病史、高血糖高滲透壓非酮性昏迷、腎臟/肝臟功能異常或懷孕。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是不可併用降血脂藥 gemfibrozil，其他如類固醇、抗黴菌藥、水楊酸、消炎止痛藥、fluoroquinolones、或其他降血糖藥須謹慎使用。
3. 可能會有**體重輕微上升**的情形，可藉由飲食及運動控制。
4. 請將本藥保存在幼童無法取得處，也不可給予別人使用。
5. 服藥初期因血糖濃度改變，可能產生短暫性視力障礙，也可能有**噁心嘔吐、腹瀉或腹痛等腸胃道不適**，一般都不嚴重且會逐漸改善，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. **服用本藥可能發生低血糖，請索取低血糖衛教單張。**
7. 本藥懷孕及哺乳期間都不建議使用，女性計畫懷孕或已懷孕或有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。